

Implicitně zadané funkce

Implicitní funkce jedné proměnné

Předpokládejme, že máme zadanou rovnici $F(x, y) = 0$. Systém Maple má možnost pomocí příkazu `implicitplot(F(x,y),x=xmin..xmax,y=ymin..ymax)` nakreslit křivku definovanou rovnicí $F(x, y) = 0$. Nejdřív ale musíme zavolat knihovnu programů `plots`, která tento příkaz zná.

- **Příklad 1:** Nakreslete křivku, která je definovaná rovnicí $e^{2x} + e^y + x + 2y - 2 = 0$

```
> F:=(x,y)->exp(2*x)+exp(y)+x+2*y-2;
```


$$F := (x, y) \rightarrow e^{(2x)} + e^y + x + 2y - 2$$

Nejdříve zavoláme knihovnu programů `plots` a potom příkaz `implicitplot`;

```
> with(plots):
```

```
> implicitplot(F(x,y),x=-2..1,y=-2..1);
```

Maple nám vykreslí následující graf



Z grafu vidíme, že rovnice $e^{2x} + e^y + x + 2y - 2 = 0$ definuje implicitně funkci $y = f(x)$ pro všechna $x \in (-2, 1)$.

Pokud rovnice $F(x, y) = 0$ definuje v okolí bodu $A = [a, b]$ implicitně zadanou funkci, můžeme vypočítat $f'(a)$, $f''(a)$, ... pomocí příkazu `implicitdiff(F(x,y),y,x)`. Takto použitý příkaz nám vypočte $f'(a)$, vyšší derivace si ukážeme na příkladu.

- **Příklad 2:** Vypočtěte $f'(0)$, $f''(0)$, $f'''(0)$ pro funkci, která je implicitně definovaná rovnicí

$$e^{2x} + e^y + x + 2y - 2 = 0.$$

Nejdříve vypočteme pro $x_0 = 0$ příslušné y_0 .

```
> b:=solve(F(0,y),y);
```

$$y_0 := 0$$

Nyní vypočteme pomocí příkazu `implicitdiff` první derivaci implicitně zadané funkce $y(x)$ a dosadíme za x hodnotu x_0 , za y hodnotu y_0 .

```
> subs(x=0,y=0,implicitdiff(F(x,y),y,x));
```

$$-\frac{2e^0+1}{e^0+2}$$

Zjednodušíme vypočtený výraz.

```
> simplify(%);
```

$$-1$$

Druhou derivaci vypočteme podobně, jen použijeme příkaz `implicitdiff(F(x,y),y,x$2)` pro druhou derivaci implicitně zadané funkce.

```
> subs(x=0,y=0,implicitdiff(F(x,y),y,x$2));
```

$$-\frac{8(e^0)^3+20(e^0)^2+17e^0}{(e^0)^3+6(e^0)^2+12e^0+8}$$

```
> simplify(%);
```

$$-5/3$$

Podobně spočteme třetí derivaci.

```
> subs(x=0,y=0,implicitdiff(F(x,y),y,x$3));
```

$$-2 \frac{24 (e^0)^5 + 90 (e^0)^4 + 147 (e^0)^3 + 162 (e^0)^2 + 63 e^0}{(e^0)^5 + 10 (e^0)^4 + 40 (e^0)^3 + 80 (e^0)^2 + 80 e^0 + 32}$$

```
> simplify(%);
```

$$-4$$

Implicitní funkce dvou proměnných


• **Příklad 3:** Nakreslete plochu, která je definovaná rovnicí $x^2 + yx^2 - 3 + z^2 = 0$. Zjistěte, zda rovnice definuje v okolí bodu $(x_0, y_0, z_0) = (1, 1, 1)$ implicitně zadanou funkci $z = f(x, y)$ a vypočtěte derivaci této funkce v bodě $(1, 1)$.

Nejdříve zavoláme knihovnu programů `plots` a potom pomocí příkazu `implicitplot3d` vykreslíme plochu, která je definována rovnicí $F(x, y, z) = 0$.

```
> with(plots):
```

```
> implicitplot3d(F(x,y,z),x=-3..3,y=-3..1,z=-2..2,axes=boxed,style=PATCHNOGRID);
```

Maple nám vykreslí následující graf



Ověříme, zda bod $(1, 1, 1)$ splňuje rovnici $F(x, y, z) = 0$


```
> F(1,1,1);
```

$$0$$

Nyní si vykreslíme plochu pouze v okolí bodu $(1, 1, 1)$.

```
> with(plots):
```

```
> implicitplot3d(F(x,y,z),x=0.8..1.2,y=0.8..1.2,z=0..1.5,axes=boxed,style=PATCHNOGRID);
```



Z tohoto grafu vidíme, že rovnice $x^2 + yx^2 - 3 + z^2 = 0$ definuje implicitně funkci $z = f(x, y)$ pro všechna $x \in (0.8, 1.2)$ a $y \in (0.8, 1.2)$.

Nyní vypočteme pomocí příkazu `implicitdiff` první parciální derivace implicitně zadané funkce $z = f(x, y)$ a dosadíme za x hodnotu 1, za y hodnotu 1 a za z hodnotu 1. Vypočteme tedy $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 1)$ a $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 1)$.

Výpočet $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial x}$:

```
> implicitdiff(F(x,y,z),z(x,y),x);
```

$$\frac{-x(1+y)}{z}$$

Výpočet $\frac{\partial f}{\partial x}(1,1)$:

```
> subs(x=1,y=1,z=1,implicitdiff(F(x,y,z),z(x,y),x));
```

$$-2$$

Výpočet $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial y}$:

```
> implicitdiff(F(x,y,z),z(x,y),y);
```

$$-\frac{x^2}{2z}$$

Výpočet $\frac{\partial f}{\partial y}(1,1)$:

```
> subs(x=1,y=1,z=1,implicitdiff(F(x,y,z),z(x,y),y));
```

$$-\frac{1}{2}$$